

Предтрансфузионный эпикриз

Больной _____ Возраст _____
(фамилия, имя, отчество) (лет)

находится на стационарном лечении в _____ отделении
ГЛПУ ТО «ОБ № 4» с _____, у больного имеется одышка (ЧДД = _____
(дата госпитализации)

в минуту в покое, ЧДД = _____ в минуту при движении, при нагрузке), тахикардия
(ЧСС = _____ в минуту), гипотония (АД = _____ / _____ мм.рт.ст.)

В общем анализе крови от _____ анемия тяжелая, средней степени тяжести
(дата анализа)

Hb = _____ г/л. Эр = _____ $\times 10^{12}$ /л, Ht = _____ %.

Учитывая признаки гемической гипоксии, анемии тяжелой степени, другие
показания: показано переливание больному одногруппной эритроцитарной массы _____
_____, плазмы, тромбоцитарной массы
(группа крови, Rh-фактор)

лейкоцитарной массы, прочее _____
в объеме _____ миллилитров.

Согласие больного на операцию переливания препаратов крови получено. Показания
для переливания препаратов крови установлены консилиумом врачей по причине: _____

(заполняется при невозможности получить согласие больного и абсолютных показаниях для переливания препаратов крови)

Противопоказаний для переливания препаратов крови нет.

Дата переливания _____

Лечащий врач _____
(подпись) (Ф.И.О. врача)

Заведующий
отделением _____
(подпись) (Ф.И.О. врача)